

Tan rouge

Nom vernaculaire

Weinmannia

Genre

tinctoria

espèce

Cunoniacées

Famille



C'est un arbre qui atteint 15 mètres de hauteur, au port trappu (le tronc peut atteindre 1 mètre de diamètre). L'écorce est sombre et rugueuse, riche en tannin.

Les feuilles présentent une forme caractéristique. Elles sont composées de petites folioles oblongues à marge dentée et surtout un rachis ailé : des excroissances foliaires de chaque côté de l'axe central de la feuille, entre les folioles.

Les stipules sont bien visibles et l'insertion des feuilles opposées présente un renflement net.

Les fleurs apparaissent entre janvier et juillet sous la forme de pompons odorants à l'extrémité des rameaux. Les fruits sont de petites capsules qui libèrent de minuscules graines noires.

La Tan rouge est commun dans les forêts humides d'altitude, entre 500 et 1700 mètre d'altitude. Le nectar de ses fleurs permet de produire le fameux miel vert

François Vandeschrieke, 2007

10	<input type="checkbox"/> Exotique <input type="checkbox"/> Indigène <input type="checkbox"/> Endémique Run/Mada <input type="checkbox"/> Endémique Run/Mau <input type="checkbox"/> Endémique Réunion <b>Origine :</b>	<input type="checkbox"/> autre <input type="checkbox"/> se détachant <input type="checkbox"/> spongieuse <input type="checkbox"/> rugueuse <input type="checkbox"/> ponctée <input type="checkbox"/> striée <input type="checkbox"/> lisse <b>Ecorce :</b>	<input type="checkbox"/> engainantes <input type="checkbox"/> longues <input type="checkbox"/> courtes <input type="checkbox"/> cicatrices <input type="checkbox"/> absence <b>Stipules :</b>	<input type="checkbox"/> épineuse <input type="checkbox"/> poilue <input type="checkbox"/> glabre <input type="checkbox"/> absence <b>Gaine foliaire :</b>	<input type="checkbox"/> tronc ramifié <input type="checkbox"/> monocaulé <input type="checkbox"/> liane <input type="checkbox"/> pas de tronc <b>Allure générale :</b>
9					
8					
7	<input type="checkbox"/> autre <input type="checkbox"/> section ailée <input type="checkbox"/> section en dépression <input type="checkbox"/> section aplatie <input type="checkbox"/> section cylindrique <input type="checkbox"/> variable <input type="checkbox"/> long <input type="checkbox"/> moyen $1/10 < < 1/3$ <input type="checkbox"/> court <input type="checkbox"/> absence <b>Pétiole :</b>	<input type="checkbox"/> verticillées <input type="checkbox"/> alternes distiques <input type="checkbox"/> alternes spirales <input type="checkbox"/> opposées simples <input type="checkbox"/> opposées décussées <b>Disposition des feuilles :</b>	<input type="checkbox"/> autre <input type="checkbox"/> palmée <input type="checkbox"/> pennée <input type="checkbox"/> bipennée <input type="checkbox"/> tripennée <input type="checkbox"/> paripennée <input type="checkbox"/> imparipennée <b>Composée :</b>	<input type="checkbox"/> autre <input type="checkbox"/> tricuspidé <input type="checkbox"/> palmatilobée <input type="checkbox"/> cordée <input type="checkbox"/> lancoéte <input type="checkbox"/> spatulée <input type="checkbox"/> en aiguille <input type="checkbox"/> en ruban <input type="checkbox"/> deltoïde <input type="checkbox"/> elliptique <input type="checkbox"/> ovale <input type="checkbox"/> ronde <b>Feuille simple :</b>	<input type="checkbox"/> parallèles <input type="checkbox"/> palmées <input type="checkbox"/> pennées <input type="checkbox"/> autres <b>Nervures :</b>
6					
5					
4					
3					
2	<input type="checkbox"/> pas d'odeur particulière <input type="checkbox"/> odeur aromatique <b>de la feuille froissée :</b>	<input type="checkbox"/> absence <input type="checkbox"/> présence <b>Domaties :</b>	<input type="checkbox"/> absence <input type="checkbox"/> présence <b>Latex :</b>	<input type="checkbox"/> absence <input type="checkbox"/> présence <b>Epines :</b>	<input type="checkbox"/> absence <input type="checkbox"/> présence <b>Poils</b>
1					

François Vandeschrieke, 2007

Nom vernaculaire

Genre

espèce

Famille

Tan rouge

Weinmannia

tinctoria

Cunoniacées